

### Un nouveau *Thamnurgus* pour l'Alsace: *Thamnurgus varipes* Eichhoff

Alerté par un collègue (Laclos) qui s'étonnait de l'absence de cette espèce de notre catalogue, nous avons entrepris dès juin 2000 la surveillance de quelques colonies d'*Euphorbia amygdaloides*, l'Euphorbe des bois, sa plante-hôte principale, dans quelques stations forestières ensoleillées du Bas-Rhin.

Dans l'une d'elles, Oberhaslach (67), Forêt de Haslach, nous avons observé dès fin-juin les trous d'entrée et des larves de belle taille. Au-delà, fin-juillet, sont apparus les premiers adultes immatures. (Schott).

Comme indiqué par Laclos, *T. varipes* recherche les plantes les plus vigoureuses, surtout celles des lisières et des bords des chemins. Elle pond dans les tiges fleuries et le développement larvaire, qui se fait surtout au détriment de la moelle, n'entraîne pas, comme chez *T. kaltenbachii* Bach sur la Germandrée, la formation de galles et le dépérissement de la partie de la plante située au-dessus.

Comme c'est probablement également le cas chez *kaltenbachii*, les générations de *varipes* se recourent: des individus frais en maturation sont déjà présents dans les tiges en juillet-août alors que l'ancienne génération continue de creuser des nidifications dans des tiges vertes (Schott, Callot).

Pour plus de précisions se reporter à la rubrique "Dernières nouvelles du catalogue des Coléoptères d'Alsace", tome 12 *Hydrophilidae* par H. Callot, qui paraîtra prochainement.

Claude Schott